

【説明と同意書】ボツリヌストキシン注射治療

□1. この治療の内容


- ・ボツリヌストキシン治療に用いられる製剤は、ボツリヌス菌の作り出すA型ボツリヌス毒素(天然のタンパク質)を有効成分としており、当院では厚生労働省に認可された製剤のみを使用しています。
- ・ボツリヌストキシン治療は、「シワをとる」注射ではなく表情ジワの原因となる筋肉(表情筋)の動きを抑える事でシワが刻まれるのを防ぐ注射です。また、筋肉を弛緩させることで、筋肉の動きによってできるシワやふくらみを軽減させます。
- ・汗の分泌を抑える効果もあります。
- ・治療を続けていくうちにごく稀に体内に抗体が作られ、効果が減弱する可能性があります。

□2. 方法と注意事項

- ・方法：生理食塩水で溶かしたボツリヌストキシン製剤を必要な部位に注射します。

□3. 治療効果

- ・効果は、注射後早くても2~3日後より現れ、2週間程度で安定化します。
- ・効果持続期間は、3~6か月です。個人差があります。



□4. この治療に伴う注意事項と起こりうる合併症

<注意事項>

投与前

以下の項目に当てはまる疾患をお持ちの方は、施術できません。必ず事前にお申し出ください。

- ・全身性の筋肉の病気(重症筋無力症、筋委縮性側索硬化症など)の方
- ・閉塞隅角緑内障の方
- ・この薬剤を以前に使用しアレルギーを経験したことのある場合やアレルギー体質の方
- ・妊婦、妊娠している可能性のある方、授乳中の方
(男女ともに、ボトックス治療後6か月は避妊が必要です)


投与後

- ・施術当日は、激しい運動や血流が良くなる行為は避けてください。
- ・注射直後から、お化粧品や洗顔は可能ですが、施術後 24 時間以内は注射部位を揉んだり強くこすったりしないでください。

<合併症>

起こりうる合併症として、以下のものがあります。症状には個人差があります。

- ① 注射部位の皮下出血、痛み
- ② 頭痛、アレルギー反応（注射部位やその周辺の発赤、腫脹、かゆみなど）
- ③ 違和感、左右差、表情がぎこちない
- ④ その他部位の問題
 - ・額、眉間の注入時➡眼瞼下垂・眉毛下垂・眉毛の非対象・眉毛の不自然な吊り上がり
二重ラインの変化（幅が狭くなる）
 - ・口周りへの注入時➡うがいのしづらさ・口角の非対称、話しづらい
 - ・エラ（咬筋）注入時➡一時的なデコボコ感
 - ・笑顔の調整注入時➡左右差・笑いづらさ
 - ・その他部位注入時➡



※合併症の多くは軽度で、2～3 週間程度で改善します。

※必要に応じて追加調整を行います。

※ボトックスが作用した筋肉の動きは 3～6 ヶ月で回復します。

□ 5. 偶発症発生時の対応

万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置を行います。

□ 6. 代替可能な治療

深い表情シワでは、ヒアルロン酸などを注射する治療が有効なこともあります。

□ 7. 治療の同意を撤回する場合

一旦同意書を提出しても、治療が開始されるまでは、本治療を受けることを撤回することができます。

(説明者)

説明年月日： _____年_____月_____日 説明医： _____

(同意者)

同意年月日： _____年_____月_____日 同意者： _____

Beauty Tuning Clinic

住所：〒810-0001 福岡市中央区天神 5 丁目 7-7-5F

電話番号：092-717-8640 FAX：092-717-8641