

## シミ・あざ治療を受けられた方へ



### 処置後～

レーザー処置をした部位には、皮膚の保護のため茶色のテープを貼っています。

ヒリヒリ感やほてり感は徐々に落ち着きますが、気になるときは冷やしていただいて構いません。

※テープの交換方法については次ページをご確認ください



### レーザー照射翌日

レーザーを照射した部分は茶色のかさぶたになります。



### 7日目頃～

7～10日程度するとかさぶたが剥がれて、きれいな新しい皮膚ができます。

※かさぶたは無理に剥がさないでください

この状態になると、テープ保護する必要はありません。強い赤みが続く場合は、夜1回軟膏を塗布してください。（施術後2週間程度）紫外線対策と摩擦にはご注意ください。



### 1か月後～

その後、照射部位の赤みや色素沈着が1～2ヶ月程度続くことがあります、徐々に目立たなくなります。

※シミの種類により、かさぶたにならない場合や色の変化が分かりにくいことがあります

初めて治療を受けられた方は、処置後2～4週間前後を目安に診察にお越しください。その他、異常を感じられた場合やご不明な点がございましたらご連絡ください。

# テープの交換方法と軟膏の塗り方

テープは基本貼ったままで構いません。


テープを貼ったまま洗顔や化粧をしてください。

※テープの周りが汚れたり、剥がれたりした場合は、交換用のテープに貼り替えてください。

## 交換方法

- ① そっと優しくテープを剥がす
- ② 洗顔 … 洗顔料使用可能
- ③ 優しく水分を拭き取る
- ④ 茶色のテープを適当な大きさに切って貼る
- ⑤ 化粧水などで保湿する
- ⑥ 軟膏をテープの上から優しく塗る (※)

※ 1日2回 (朝・夜)



※ テープ未使用時やかさぶたが剥がれた後は、外出時には必ず日焼け止めクリームをご使用になり、日焼けを防いでください。



BEAUTY TUNING CLINIC

美容調律診療所

TEL : 092-717-8640